

21 Februar, 2012

Handout Darmkrebsvorsorge

Lebenszeitrisiko für Darmkrebs 6%

Neuerkrankungen in Deutschland ca 73 000
Zahl der Sterbefälle ca 27 000 pro Jahr
In 2010 erstmals rückläufig auf 26 000

Bis Ende 2008 3,3 Millionen Vorsorgekoloskopien

Ergebnisse des online Registers bng (Berufsverband niedergelas. Gastroenterologen
270 000 Vorsorgekoloskopien wurden ausgewertet

Ergebnisse:

Karzinome in 0,8%

Tubuläre Adenome in 15%

Advancend adenomas 7% (ca 10% sind Risikopolypen) Riemann et.al. 2011

Tumorstadien UICC I 47%(tumor auf mucosa und submucosa) UICC I II (tumor T3 und T4 ohne Lymphknotenbeteiligung) 22% UICC I und II 69%
(Union internationale contre le cancer)

Teilnehmerrate seit 10Jahren: Männer 18% Frauen 20%

Teilnehmerrate jährlich bei 3-4% der Berechtigten

Kardiopulmonale Komplikationen 0,1%

Blutungskomplikation 0,8%

Perforationen 0,02%

Perforationen bei Polypektomien 0,09%

Bisher ist eine Reduktion der Inzidenz des kolorektalen Karzinoms in Deutschland um 15% zu verzeichnen.

Literatur:

Die Vorsorgekoloskopie in Deutschland Stand 2010

Bokemeyer und Hüppe Verdauungskrankheiten 2/2010

Zwischenbilanz der Früerkennungskoloskopie nach 8 Jahren

Brenner Dtsch. Ärzteblatt 43/2010

Darmkrebsfrüherkennung im nationalen Krebsplan

Riemann ZfG 49/2011